

Postanite dio revolucije uz Velum® Prime!



VELUM® PRIME

Što je Velum® Prime?

Bayerovo pouzdano rješenje za suzbijanje nematoda.

Velum® Prime je sistemični nematocid s dodatnim fungicidnim učinkom koji suzbija nematode iz roda *Meloidogyne* spp., *Heterodera* spp., *Pratylenchus* spp., *Ditylenchus* spp. i *Radopholus* spp. te štiti korijen biljke od nematoda i potencijalnih sekundarnih infekcija.

Zašto odabratи Velum® Prime?

- // Velum® Prime je proizvod dobroih ekotoksikoloških svojstava – **siguran je za tlo i korisne organizme, opasan za nematode.**
- // **Pouzdano i učinkovito suzbija nematode** pri niskim dozama.
- // Osnovna **ranu i dugu zaštitu korijena** uz prilagodljivu, jednostavnu primjenu.
- // Dodatno pruža i odličnu zaštitu od pepelnice na plodovitom povrću.

Kako se primjenjuje Velum® Prime?

Velum® Prime sadrži flouripam (400 g/L), aktivnu tvar koja nudi učinkovito i sigurno rješenje protiv nematoda.

Kada se Velum® Prime primjenjuje na otvorenom, dozvoljena je jedna primjena godišnje na svim kulturama za koje je proizvod namijenjen.

- // Na tikvici, lubenici, tikvi, paprici, rajčici, patlidžanu, krastavcu i dinji protiv nematoda korijenovih krvica primjenjuje navodnjavanjem sistemom kap po kap pri dozi od 0,625 L/ha u 2000-10000 L vode/ha, 1-3 dana prije presađivanja ili 1-3 dana nakon presađivanja.

- // Na mrkvi protiv nematoda korijenovih krvica, mrkvine nematode i nematode smeđe pjegavosti korijena, primjenjuje se prskanjem 1-10 dana prije sjetve u količini od 0,625 L/ha u 200-1000 L vode/ha i inkorporacijom u tlo na dubinu 5-10 cm.
- // Na duhanu protiv nematoda korijenovih krvica i duhanove cistolike nematode, primjena, doza i utrošak jednaki su kao i kod mrkve.
- // Na krumpiru protiv nematoda korijenovih krvica i krumpirove cistolike nematode, primjenjuje se prskanjem 1-3 dana prije sadnje u količini od 0,625 L/ha u 200-800 L vode/ha i inkorporacijom u tlo na dubinu od 10 cm ili se primjenjuje prskanjem u redove u prilikom sadnje u količini od 0,625 L/ha u 200 L vode/ha i inkorporacijom u tlo na dubinu od 5 cm. Ako se kod primjene na krumpiru inkorporira na dubinu 10-20 cm, sredstvo se smije primjeniti jednom svake druge godine.

Kada se Velum Prime primjenjuje u zaštićenom prostoru, dozvoljena su najviše dva tretiranja godišnje.

- // Na rajčici, patlidžanu, paprici, krastavcu, dinji, lubenici, tikvici i tikvi u zaštićenom prostoru, primjenjuje se kroz sustav za navodnjavanje sistemom kap po kap pri dozi 0,375 – 0,625 L/ha i utrošku vode 2000 – 6000 L/ha. Primjenjuje se 1 – 3 dana prije presađivanja ili 1 – 3 dana nakon presađivanja, a moguće je ponoviti tretiranje 15 – 30 dana nakon prve primjene u slučaju jačeg napada nematoda.

